

## Dere Alabalıđý (Salmo trutta forma fario)

Gönderen : mku - 03/04/2008 00:48

<http://www.cilginbalikci.com/images/balik/derealasi-1.jpg>

<http://www.cilginbalikci.com/images/balik/derealasi-1.jpg>

<http://www.cilginbalikci.com/images/balik/derealasi-1.jpg>

Salmonidae familyasýndan avrupada çok yaygýn olan bir alabalýk türü. Avrupanýn bazı bölgelerinde Amerika'dan getirilmiþ olan gökkuþaðý alabalýđý bu yerli alabalýk türünün neslini tehlikeye sokmuþtur. Bu alabalýđýn bir de sadece Türkiye'de, Sivas'ýn Güneþli ilçesinde kaynađýnda görülen bir alt türü mevcuttur: Salmo trutta fario.

Rengi yapadýđý ortama göre deđipken olup, genellikle sýrt yeþilimsiden kahverengine kadar deđipen renkte, yanlar daha ađýk, karniyon parlak renktedir. Baþ ve yanlarda sarýdan altýn rengine kadar deđipen bir renk tonu vardýr. 40-50 cm boya ve 0,5-1,0 kg ađýrlýđý kadar çýkabilirler.

Yapadýklarý alanýn büyüklüđüne bađlantýlý olarak böcek ve böcek larvalarýndan, sinek ve sinek larvalarýndan, küçük balýklardan yengeçlerden beslenirler, ama dere alabalýklarý arasýnda yamyamlýk da yaygýndýr.

Akarsularda dere alabalýđý, uygun vücut þekli ile çok hýzly hareket edebilir. Avlanýrken su bitkilerinin arkasýna saklanýr ve sonunda bir atýlýþ ile saldýrýr. Tipik sođuksu balýđý olan dere alabalýđý berrak, bol oksijenli sođuk sularda özellikle akarsularda bulunur.

Üremeleri Ekim-Aralýk aylarý arasýnda, akarsuyun kaynak kýsýmlarýna yakýn çakýllýk, kumlu yerlerde olmaktadır. Bulunduđu kaynađa dođru kýsa bir yumurtlama göçü yapar. Larvalar su sýcaklýđýna bađlý olarak 200-250 gün-derece arasýnda çýkarlar.

Dere alabalýđýnýn bazen diđer bir Salmonid olan Salvelinus fontinalis ile karýþýmý üzere garip çizgili melezler meydana gelir. Bu melezler Kaplan alabalýđý denir.

balýksevdasy.com'dan alýntýdýr.

=====